

登園基準表

学校法人 鳳明学園 HOCこどもの森保育園

※朝の体温が37.5度以上の時には登園を見合わせるよう、ご協力をお願いいたします。

	病名	潜伏期間	感染経路	感染可能期間	主な症状	登園基準
1	インフルエンザ	1～3日	飛沫・接触	症状がある期間	発熱、全身倦怠、腹筋痛、鼻カタル、咽頭痛、咳	発症後5日経過し、かつ、解熱後3日経過するまで
2	百日咳	7～10日	飛沫・接触	感染後約3週	発作性咳の長期反復、持続	特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
3	はしか（麻疹）	10～12日	空気・飛沫・接触	発熱出現1～2日前から発疹出現後4～5日	上気道のカタル、発熱、粘膜疹コプリック斑	解熱した後3日を経過し、元気がよいこと
4	おたふくかぜ（流行性耳下腺炎）	14～24日	飛沫・接触	明らかな症状を示す7日前からその後9日続く	発熱、耳下腺・舌下腺・顎下腺の腫脹及び圧痛	耳下腺、舌下腺、顎下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好であること ※疑いの場合は2～3日登園せず様子を見る
5	三日はしか（風疹）	14～21日	飛沫	発疹出現の前後7日	種々の発疹、軽熱、リンパ腺膨大	発疹が消失したとき
6	みずぼうそう（水痘）	11～21日	空気・飛沫・接触	水疱出現前2日からすべての発疹が痂皮化するまで	軽熱、発疹（斑点丘疹状⇒水疱⇒顆粒状痂皮）	すべての発疹がかさぶたになり、医師の許可がおりたとき
7	プール熱（咽頭結膜熱）（アデノウイルス）	5～7日	飛沫・接触	潜伏期後半～発症後約5日間	発熱、咽頭炎と結膜炎の合併	解熱し、主要症状が消失してから2日経過するまで
8	流行性角結膜炎（はやり目）	1週間以上	飛沫・接触	発症後約2週間	軽熱、頭痛、全体倦怠、結膜炎の炎症、眼瞼浮腫、目やに	目の症状が治まり、医師が伝染の恐れなしと認めたとき
9	結核	1～2か月	空気	喀痰の塗抹検査が陽性の間	咳、痰、発熱が2週間以上遷延	治癒するまで
10	ヘルパンギーナ	2～4日	飛沫・接触	発症から数週間	高熱、咽頭痛、咽頭に水疱	解熱し、食事も十分にでき、元気があること
11	手足口病	3～5日	空気・飛沫・接触	発症から数週間	感冒様症状、手足口に赤斑⇒水疱	発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく普段の食事がとれること
12	りんご病（伝染性紅斑）	10～20日	飛沫	風邪症状出現から顔に発疹が出現するまで	手足に網目状の紅斑、頬部の赤斑性湿疹、入浴後発疹が再発	元気が良ければ登園可能
13	溶連菌感染症	2～5日	飛沫・経口	潜伏期後半～発症後約7日間（抗菌薬内服24時間）	発熱、咽頭痛、扁桃腺炎、莓舌、頸部リンパ節炎、全身に発疹	有効治療を始めて解熱後1～2日経過してから
14	ウイルス性胃腸炎（ロタ、ノロ、アデノウイルス）	1～3日	接触・糞食品媒介	症状がある期間	発熱、嘔吐、下痢、腹痛	下痢、嘔吐などの症状がおさまり、普段の食事がとれ、医師が登園を認めたとき
15	腸管出血性大腸菌感染症（O-157、O26、O111）	3～8日	経口・糞	便中に菌を排出している間	激しい腹痛、頻回の水様便、血便、発熱は軽度	症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し、48時間あけて連続2回の検便によっていずれも菌陰性が確認されたとき
16	マイコプラズマ肺炎	14～21日	飛沫	臨床症状発現時がピークでその後4～6週間	咳、発熱、呼吸困難（重症の場合）	解熱し、普段の食事ができ元気がなったとき
17	突発性発疹	約10日	飛沫・経口・接触	発熱中	高熱、3日後に全身に発疹	解熱し、機嫌がよく全身状態が良いこと
18	RSウイルス感染症	2～8日	飛沫・接触	通常3～8日間（乳児では3～4週間）	発熱、鼻汁、咳嗽、喘息、呼吸困難	重篤な呼吸症状が消失し、全身状態が良いこと
19	帯状疱疹	不定	接触		小水疱が肋間神経に沿った形で片側性に現れる	すべての発疹がかさぶたになり、医師の許可がおりたとき
20	頭シラミ	10～14日	頭皮から頭皮への接触、衣服や寝具を介する	産卵から最初の若虫が孵化するまでの期間は10～14日	小児では多くが無症状、頭髪の中に虫体を確認、または毛髪にふけのような卵の付着	駆除を開始していることが確認できれば登園可能であるが、状態によっては園の判断による
21	ヘルペス口内炎	3～7日	接触	水疱を形成している間	口内炎症、口角、口唇の皮膚粘膜に水疱（口唇ヘルペス）	症状が改善し、元気があれば登園可能
22	とびひ（伝染性膿痂疹、皮膚化膿症）	2～10日	接触	効果的治療開始後24時間	主として豆つぶ状の水疱、自覚症状あまりなし	皮膚乾燥しているか、湿潤部位が被覆できる程度のものである
23	水いぼ（伝染性軟属腫）	2～7週間	接触	不定期	球状のいぼ	掻きこわし傷から滲出液が出ているときは被覆すること

※上記感染症以外にも、園の判断により登園許可書やお休みをお願いする場合がございます。予めご理解の程お願い致します。